

Tabelul 4

Caracteristici tehnologice și fizico-chimice ale soiurilor și biotipurilor locale de struguri cu însușiri mixte

Soiul / Biotipul	Localitatea	Zahăr (g/l)	Aciditate (g/l H ₂ SO ₄)	Indice gluco-acidimetric	Potențial alcoolic	Zahăr (diferență față de martor)
Albe						
RB Alb	Roșia	153	5,1	30	9	-22
Buziaș U 21	Buziaș	217	3,2	67,81	12,76	+42
Buziaș AȘ 33	Buziaș	171	4,9	34,89	10,05	-4
Regina viei 21	Buziaș	114	4,51	25,27	88	-61
Căpșunică Albă de Șarlota	Șarlota	127	6,3	20,15	7,47	-48
Alb de Măderat 606	Măderat	149	5,2	28,65	8,76	-26
Roz de Silagiu	Silagiu	155	4,9	31,63	9,11	-20
Chasselas dore Mt	Timisoara	175	3,15	55,55	10,29	-
Roșii						
Nănașă de Măderat	Măderat 606	178	4,6	38,69	10,47	+3
Lipovan	Liubcova	155	4,9	31,63	9,11	-20
Buziaș TH	Buziaș Str. Târgului	191	4,2	45,47	11,23	+16
Negru rar de Buziaș	Buziaș	158	4,7	33,61	9,29	-17
Fragă neagră de Buziaș	Buziaș	127	6,5	19,53	7,47	-48
Buziaș AȘH	Buziaș	140	5,8	24,13	8,23	-35
Negru de Buziaș	Buziaș	147	5,4	27,22	8,64	-28
Negru mic de Silagiu	Silagiu	204	3,8	53,68	12	+29
Negru vânat de Silagiu	Silagiu	166	4,5	36,88	9,76	-9
Negru rămușor de Silagiu	Silagiu	153	4,9	31,22	9	-22
Negru de Șarlota	Șarlota	168	4,4	38,18	9,88	-7
Chasselas dore Mt	Timisoara	175	3,15	55,55	10,29	-